



Tabela 6.1 Quantidade de espécies visualizadas por classes

Grupos	Nº de espécies
Cefalópodes	4
Gastrópodes	66
Bivalves	19
Poliplacóforos	8
Total	97

Moluscos

6







Família: Octopodidae



Polvo-comum, *Octopus vulgaris*



Polvo, *Callistoctopus macropus*



Polvo-de-areia, *Octopus* sp.



Polvo-comum, *Octopus vulgaris*



Ovos de Choco, *Sepia officinalis*

Família: Sepiidae



Choco, *Sepia officinalis*











Cona-de-bédja, *Aplysia dactylomela*



Cona-de-bédja, *Aplysia fasciata*



Cona-de-bédja, *Aplysia depifans* ou *punctata*?



Cona-de-bédja, *Aplysia* sp.



Ovos de *Aplysia* sp.





Lesma-do-mar-de Cabo-Verde, *Hypselodoris picta verdensis*





Lesma-do-mar, *Phidiana* sp.



Família: Discodorididae




Lesma-do-mar, *Hoplodoris* sp.

Família: Flabellinidae



Lesma-do-mar, *Flabellina* sp.

Família: Plakobranchidae



Lesma-do-mar-de-Cabo-Verde, *Flabellina* cf. *arvelei*



Lesma-do-mar, *Elysia ornata*





Lesma-do-mar, *Thuridilla picta*



Família: Pleurobranchidae

Lesma-do-mar-de-Cabo-Verde, *Pleurobranchus* cf. *garciagomezi*



Lesma-do-mar-de-Cabo-Verde, *Pleurobranchus* cf. *garciagomezi*





Lesma-do-mar-de-Cabo-Verde, *Pleurobranchus* cf. *garciaomezi*





Lesma guarda-chuva, *Umbraculum umbraculum*





Ovos de Lesma guarda-chuva, *Umbraculum umbraculum*





Ovos de nudibrânquio? , ?





Caramujo, *Echinolittorina punctata*



Caramujo, *Littorina striata*







Caramujo, *Monodonta* sp.



Caramujo, *Phorcus mariae*



Caramujo, *Gibbula* cf. *senegalensis*

Endêmico da Mاتيota e em perigo crítico de extinção (há mais de 30 anos que não é encontrado nenhum exemplar vivo) (Tenório et al. 2019). Nos últimos anos, de que investigadores da área tenham conhecimento, foram encontrados mais de 27 cones, sem o molusco, exatamente no local para onde foi redirecionada a água das chuvas proveniente de Chã de Alecrim. Note-se que o bom estado de conservação de alguns desses cones é um bom indício de ainda haver algum vivo no local.





Cone, *Conus genuanus*



Cone, *Conus ermineus*



Cone, *Conus lugubris*



Cone, *Conus tabidus*

Porcelana



Família: Cypraeidae



Porcelana, *Erosaria spurca* f. *verdensium*



Porcelana, *Luria lurida*



Porcelana, *Zonnaria picta*







Família: Cassidae



Búzio, *Cassis norai*



Búzio, *Cypraea testiculus*

Família: Cerithiidae



Búzio, *Cerithium atratum*

Família: Columbidae



Búzio, *Columbella adansoni*



Búzios, *Mitrella ocellata*



Família: Coralliophilinae

Búzios, Cf. *Coralliophila meyendorffi*



Búzios, Cf. *Coralliophila meyendorffi*



Família: Cymatiidae

Búzios, *Monoplex cf. aquatilis*



Búzio, *Monoplex parthenopeus*



Búzio, *Monoplex trigosus*



Búzio, *Monoplex cf. nicobaricus*



Keider Neves

Família: Epitoniidae



Búzio, *Gyroscala commutata*

Família: Harpidae



Búzio, *Harpa doris*

MOUSCOS

Família: Fasciariidae



Búzio, *Leucozonia triserialis*



Família: Olividae



Búzio, *Oliva flammulata doncha*

Família: Mitridae



Búzio, *Isara cornea*

Família: Muricidae



Búzio, *Claremontiella nodulosa*





Búzio, *Hexaplex rosarium*



Búzio, *Hexaplex cf. bifasciatus*



Búzio, *Thais nodosa*





Búzio, *Stramonita haemastoma*



Búzio, *Gemophos viverratus*



Búzio, *Tonna galea*

Família: Pisaniiidae

Família: Tonnidae







Família: Calyptraeidae



Chapéu-chinês, *Trochita trochiformis*



Família: Fissurellidae



Lapa-de-bruxa, *Fissurella afra*



Lapa-de-bruxa, *Fissurella alabastrites*



Lapa-de-bruxa, *Fissurella* sp. 3



Lapa-de-bruxa, *Fissurella* cf. *verna*





Lapa-de-bruxa, *Fissurella* cf. *gallardi*



Lapa-de-bruxa, *Fissurella* spp.



Lapa-de-bruxa, *Fissurela* spp.





Lapa-de-bruxa, *Fissurella* spp.







Lapa-preta, *Patella lugubris*



Anteriormente pensava-se que seria a espécie *Siphonaria pectinata*, mas análises moleculares efectuadas a amostras do Mediterrâneo, Atlântico este e oeste, concluiu que *S. pectinata sensu strictu* está restricta ao Atlântico este e Mediterrâneo, que na Flórida e Golfo do México é a espécie *S. naufragum* e em Cabo Verde é a espécie *S. placentula* que até o momento se conhece somente nas nossas águas (Giribet & Kawauchi 2015).





Falsa-lapa, *Siphonaria placentula*



Família: Haliotidae



Oreia-d' mar, *Haliotis tuberculata fernandsi*





Familia: Vermetidae



Vermetidae, Vermetidae spp.







Família: Arcidae



Bivalve, *Arca bouvieri*



Bivalve, *Acar olivercoseli*



Bivalve, *Arca noae*



Bivalve, *Papyridea soleniformis*

Família: Cardiidae



Bivalve, *Isognomon dunkeri*





Bivalve, *Isognomon dunkeri*



Família: Lucinidae

Bivalve, *Ctena eburnea*



Amêijoia-gravada, *Lucina adansonii*

Familia: Margaritidae



Bivalve, *Pinctada imbricata*



Família: Mytilidae



Bivalve, *Brachidontes puniceus*

Família: Ostreidae



Ostra, *Crassostrea cf. tulipa*

Família: Lucinidae



Bivalve, *Dendostrea senegalensis*

Família: Pectinidae



Bivalve, *Bractechlamys corallinoides*



Bivalve, *Pecten keppelianus*



Bivalve, *Talochlamys multistriata*



Família: Psammobiidae

Bivalve, *Gari virgata*



Família: Pectinidae

Bivalve, *Venus verrucosa*



Família: Spondylidae



Ostra, *Spondylus senegalensis*



Família: Veneridae



Bivalve, *Circomphalus foliaceolamellosus*



À partida, a Laginha é o único local onde pode ser encontrado em Cabo Verde.









